

Manejo RN Con Labio Leporino Y/O Fisura Palatina

PROCEDIMIENTO	
ATENCION INMEDIATA	<ul style="list-style-type: none"> • Examen físico por Pediatra neonatólogo <ul style="list-style-type: none"> ○ Labio leporino /fisura palatina ○ Malformaciones asociadas (10% tiene malformación) <ul style="list-style-type: none"> • Síndrome Pierre Robin, Síndrome Velocardiofacial • Otros • Enviar con la madre si no existen malformaciones asociadas • Hospitalizar si existen malformaciones asociadas
SALA CUNA	<ul style="list-style-type: none"> • Siempre es posible que se alimente bien al pecho. .Idealmente semisentado o sentado sobre el muslo de la madre. La salida de leche por la nariz se debe a una postura inadecuada. • Alimentación con mamadera si no es posible lactancia exclusiva. <ul style="list-style-type: none"> • Mamadera normal con chupete para pacientes fisurados ó • Mamadera especial (exprimible) con chupete para fisurados • Eliminar gases: los niños fisurados tragan gran cantidad de aire durante la alimentación • Limpiar boca y tejidos circundantes, nariz después de cada alimentación para prevenir lesiones y micosis de tejidos
NOTIFICACIÓN GES	<ul style="list-style-type: none"> • Pediatra neonatólogo completa formulario de notificación GES
ATENCIÓN POR ESPECIALISTA	<ul style="list-style-type: none"> • Interconsulta con Genetista antes del alta • Solicitar screening auditivo con BERA. Es indicación médica, no requiere firmar consentimiento • Evaluación con Fonoaudiología en primeras 48 hrs. • Paciente realiza primera atención con especialista según la red que su Isapre asigne. Primera consulta es ambulatoria. • Matrona de puericultura entrega número telefónico de Fundación Gantz (+56223386400) y dirección web: https://gantz.cl , para que padres se comuniquen.

GUIA GES
<ul style="list-style-type: none"> • Diagnóstico: dentro de 15 días desde sospecha. Evaluación por especialista • Tratamiento: <ul style="list-style-type: none"> ○ Ortopedia prequirúrgica: < 90 días desde nacimiento ○ 1ª cirugía: 90 – 180 días desde nacimiento <ul style="list-style-type: none"> • Cierre labial: 90 – 180 días desde nacimiento • Cierre paladar blando: 180 – 365 días desde nacimiento • Cierre paladar duro: 12 – 18 meses desde nacimiento • Malformaciones craneofaciales asociadas: 90 – 365 días desde nacimiento

Bibliografía:

1. Minsal. Guía Clínica Fisura Palatina, 2