

## Manejo De Rn Con Malformaciones Menores

PROCEDIMIENTO	
<b>PAPILOMA PREAURICULAR</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ecotomografía renal ambulatoria o previa</li> </ul>
<b>MALFORMACION AURICULAR</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ecotomografía renal previa al alta</li> </ul>
<b>HEMANGIOMA , NEVUS LUMBOSACRO</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ecotomografía lumbosacra previa al alta</li> </ul>
<b>FOSA PILONIDAL</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• No requiere exámenes</li> <li>• Ecotomografía lumbosacra si existe un seno dérmico (orificio sin visualizar fondo)</li> </ul>
<b>POLIDACTILIA</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Unilateral: Sin exámenes</li> <li>• Bilateral o con malformaciones asociadas: IC Genética</li> <li>• IC cirugía prealta</li> </ul>
<b>PIE BOTT</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ecotomografía lumbosacra previa al alta</li> <li>• RX pies previa al alta</li> <li>• IC Traumatólogo previa al alta. Yeso se instala previo al alta</li> </ul>
<b>ARTERIA UMBILICAL UNICA</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ecotomografía renal ambulatoria</li> </ul>
<b>QUISTE CEREBRAL PRENATAL</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Resonancia Nuclear magnética previa al alta</li> <li>• IC Neurólogo y Neurocirujano con RNM previa al alta</li> </ul>
<b>DISPLASIA CADERAS</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ecotomografía ambulatoria caderas antes del mes si hay factores de riesgo:                             <ul style="list-style-type: none"> <li>○ parto podálica</li> <li>○ antecedentes familiares</li> <li>○ Ortolani positivo</li> </ul> </li> <li>• IC traumatólogo ambulatorio</li> </ul>

### Bibliografía:

1. Kugelman A, Bader D, Chemo M, Dabbah H. Pre-auricular tags and pits in the newborn J Pediatrics 2002;141(3):388-391.