

## Manejo Rn Con Labio Leporino Y/O Fisura Palatina

PROCEDIMIENTO	
<b>ATENCION INMEDIATA</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Examen físico por Pediatra neonatólogo               <ul style="list-style-type: none"> <li>○ Labio leporino /fisura palatina</li> <li>○ Malformaciones asociadas ( 10% tiene malformación)                   <ul style="list-style-type: none"> <li>• Síndrome Pierre Robin, Síndrome Velocardiofacial</li> <li>• Otros</li> </ul> </li> </ul> </li> <li>• Enviar con la madre si no existen malformaciones asociadas</li> <li>• Hospitalizar si existen malformaciones asociadas</li> </ul>
<b>SALA CUNA</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Siempre es posible que se alimente bien al pecho. .Idealmente semisentado o sentado sobre el muslo de la madre. La salida de leche por la nariz se debe a una postura inadecuada.</li> <li>• Alimentación con mamadera si no es posible lactancia exclusiva.               <ul style="list-style-type: none"> <li>• Mamadera normal con chupete para pacientes fisurados ó</li> <li>• Mamadera especial (exprimible) con chupete para fisurados</li> </ul> </li> <li>• Eliminar gases: los niños fisurados tragan gran cantidad de aire durante la alimentación</li> <li>• Limpiar boca y tejidos circundantes, nariz después de cada alimentación para prevenir lesiones y micosis de tejidos</li> </ul>
<b>NOTIFICACIÓN GES</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pediatra neonatólogo completa formulario de notificación GES</li> </ul>
<b>ATENCIÓN POR ESPECIALISTA</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Interconsulta con Genetista antes del alta</li> <li>• Solicitar screening auditivo con BERA. Es indicación médica, no requiere firmar consentimiento</li> <li>• Evaluación con Fonoaudiología en primeras 48 hrs.</li> <li>• Paciente realiza primera atención con especialista según la red que su Isapre asigne. Primera consulta es ambulatoria.</li> <li>• Matrona de puericultura se comunica con Fundación Gantz para que visiten a la madre: educación y entrega de información <b>02 3386400</b>.</li> </ul>

GUIA GES
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Diagnóstico: dentro de 15 días desde sospecha. Evaluación por especialista</li> <li>• Tratamiento:           <ul style="list-style-type: none"> <li>○ Ortopedia prequirúrgica: &lt; 90 días desde nacimiento</li> <li>○ 1ª cirugía: 90 – 180 días desde nacimiento               <ul style="list-style-type: none"> <li>• Cierre labial: 90 – 180 días desde nacimiento</li> <li>• Cierre paladar blando: 180 – 365 días desde nacimiento</li> <li>• Cierre paladar duro: 12 – 18 meses desde nacimiento</li> <li>• Malformaciones craneofaciales asociadas: 90 – 365 días desde nacimiento</li> </ul> </li> </ul> </li> </ul>

### Bibliografía:

1. Minsal. Guía Clínica Fisura Palatina, 2