

Manejo Rn Con Madre VIH Positivo

| |
|--|
| ATENCIÓN INMEDIATA |
| <ul style="list-style-type: none"> • Precauciones estándar • Baño completo con agua tibia y jabón de glicerina inmediatamente después de nacer • Vitamina K IM después del baño • Vacuna Hepatitis B, después del baño. • Suspender lactancia materna • Ex físico acucioso buscando hepatomegalia, esplenomegalia y adenopatías. |
| INICIAR ANTIRETROVIRALES |
| <ul style="list-style-type: none"> • Zidovudina (AZT): 2 mg/kg/dosis cada 6 horas vía oral por 6 semanas. Iniciándose 1ª dosis a las 8 h <ul style="list-style-type: none"> ○ Para los pacientes menores de 35 semanas la dosis de AZT es de 2 mg/kg/dosis cada 12 horas • Niverapina: 2 mg/kg dosis vía oral. La primera dosis a las 2 h. de vida y la segunda a las 72 h. de vida, cuando la madre utilizó nevirapina dentro de su terapia antiretroviral, o si no utilizó terapia o sólo AZT durante el parto. |
| SOLICITAR EXÁMENES |
| <ul style="list-style-type: none"> • NO vacunar BCG hasta que linfocitos CD4 estén sobre 35%. • Realizar exámenes antes de las 48 h de vida <ul style="list-style-type: none"> ○ PCR DNA HIV: Se envía la muestra al Instituto de Salud Pública # ○ Antigenemia P24: Se envía la muestra al Instituto de Salud Pública # ○ Elisa HIV: Se envía la muestra al Instituto de Salud Pública # ○ Recuento de linfocitos CD4 Se envía la muestra al H.U Chile, Laboratorio de Inmunología ○ Hemograma ○ Pruebas hepáticas. ○ Gases. ○ Sodio, potasio, cloro y ácido láctico. ○ PCR citomegalovirus en orina ○ VDRL, Ags VHB, Anticuerpos VHC, PCR Chagas y toxoplasmosis <p># Existen formularios para estos exámenes: www.ispch.cl : Formularios: Solicitud de exámenes.</p> |

Bibliografía

1. Peter L. Havens, MD, Lynne Evaluation and Management of the infant Exposed to HIV-1 in the United States Pediatrics 2008 ;123:175–187
2. Guías Minsal 2013.
3. <http://sochog.cl/wp-content/uploads/2019/04/LINEAMIENTOS-VACUNACION-HEPATITIS-B-EN-EL-RECIEN-NACIDO.pdf>