

Manejo Rn Hijo De Madre Con Varicela

ADMINISTRAR INMUNOGLOBULINA HIPERINMUNE ANTIVARICELA ZOSTER

RN hijo de madre con varicela que inicia exantema en período de 5 días antes a 2 días después del parto

- Hospitalizar para administrar inmunoglobulina
- Aislamiento de contacto y respiratorio
- Inmunoglobulina Hiperinmune antivariçela Varitect® < 72 h. de vida 125 UI (5ml) endovenosa
 - Iniciar infusión a 0,1 ml/kg por 10 minutos
 - Si no hay reacciones adversas aumentar velocidad gradualmente hasta 1,0 ml/kg/hora

ALTA A SALA CUNA DESPUÉS DE FINALIZAR ADMINISTRACIÓN DE INMUNOGLOBULINA

- El RN permanecerá en la habitación de su madre, donde se realizarán los controles y peso.
- El personal que ingresa a la habitación debe utilizar mascarilla N95, pechera desechable y guantes
- Si se alimenta con mamadera avisar a Sedile para cumplir manejo de aislamiento de retorno de mamadera

Bibliografía:

1. American Academy of Pediatrics, Committee on Infectious Disease. 2006 In Red Book: Report of the committee on infectious, 27 th ed. Elk Grove Village: American Academy of Pediatrics 2006