

Manejo Rn Hijo De Madre Consumidora De Cocaína

PROCEDIMIENTO		
	SINTOMÁTICO	ASINTOMÁTICO
	<ul style="list-style-type: none"> • Temblor, irritabilidad, hipertonía • Convulsiones 	
Hospitalización	<ul style="list-style-type: none"> • SI 	<ul style="list-style-type: none"> • NO • Seguimiento con pediatra y neurólogo
Tratamiento	<ul style="list-style-type: none"> • Fenobarbital para manejo de convulsiones 	<ul style="list-style-type: none"> • NO
Exámenes	<ul style="list-style-type: none"> • RMN cerebral • Ecotomografía Renal • Estudio materno HIV, Sífilis y Hepatitis B • Estudio toxicológico 	<ul style="list-style-type: none"> • NO • NO • Estudio materno HIV, Sífilis y Hepatitis B • Estudio toxicológico
Lactancia	<ul style="list-style-type: none"> • Contraindicada si persistirá consumo durante amamantamiento 	<ul style="list-style-type: none"> • Contraindicada si persistirá consumo durante amamantamiento

Bibliografía

1. American Academy of Pediatrics Committee on Drugs. Neonatal Drug Withdrawal. Pediatrics 1998;101(6):880