## Vitaminas ACD

#### Polivitamínico:

- Vitamina A: esencial para la visión, función inmune y madurez de células
- Vitamina C: favorece el crecimiento y reparación de tejidos.
- Vitamina D (400 U.I): esencial para la formación huesos.

#### **Cuidados:**

- Administrar una vez al día
- Mantener frasco a T° ambiente

Presentación: 1cc= 400 U.I

En nuestra unidad utilizamos las vitaminas ABECIDIN. En caso de que se indique otra marca, verifique con su pediatra la dosis correcta.



# Sulfato Ferroso

#### Suplemento esencial para:

- -Transporte de oxígeno en la sangre
- -Refuerzo sistema inmune

#### **Cuidados:**

- -Administrar una vez al día
- -Dar alejado de las comidas (ideal 1hora antes)
- -Mantener frasco a T°ambiente

En nuestra unidad usamos Ferrigot Presentación: 1cc= 25mg

(Si su pediatra cambia a otra presentación asegúrese de preguntarle por la dosis)





# «ÁCIDO FÓLICO»

#### Ácido fólico (Vitamina B9):

 Suplemento esencial para el correcto desarrollo cerebral del bebé y la fabricación de glóbulos rojos (previene anemia del prematuro)

#### **Cuidados:**

- Administrar una vez al día o según indicación médica.
- Mantener refrigerado

Presentación: 1cc= 50mcg



# Zinc

Suplemento esencial para el desarrollo cerebral y fortalecimiento del sistema inmune de prematuros alimentados con leche materna.

#### **Cuidados:**

- -Administrar una vez al día
- -Mantener frasco a T°ambiente

### En nuestra Unidad Usamos Alta Zinc Presentación: 1cc= 5mg


(Si su pediatra cambia la marca asegúrese de preguntar por la dosis)



### Cálculo de dosis

• Ejemplo: Se indica administrar 5mg de sulfato ferroso (Ferrigot presentación: 25mg en 1cc)

25mg 
$$\rightarrow$$
 1cc  
5mg  $\rightarrow$  ??



Debe multiplicar cruzado, o sea 5 x 1, y luego dividir por 25, lo que resulta 0,2cc.

Por lo tanto, debe sacar del frasco 0,2cc, que equivale a 5mg de sulfato ferroso y administrarlo a su hijo.

## En jeringa dosificadora de 1cc:



### ¿Cómo dar los medicamentos a su bebé?



- -Adminístrelos antes de la lactancia materna o de la alimentación por chupete.
- -Use una jeringa dosificadora y verifique siempre la dosis indicada
- -Su bebé debe estar despierto y en posición semi-sentado
- -Coloque la jeringa contra el interior de su mejilla y deje que succione, si no, presione lentamente el émbolo de la jeringa (goteo).
- -No lo acueste inmediatamente