

Caso 1

- RNT 38 semanas. Cesárea electiva. Ruptura de membranas intra parto.
- PN: 3,500 g.
- Durante la visita de puerperio a las 24 h de nacimiento la madre le consulta por aumento de volumen en escroto

Responder:

- ¿Cuáles son los posibles diagnósticos para un aumento de volumen en escroto?
- ¿Qué información relevante puede obtener usted de la historia y que lo puede ayudar en el diagnóstico diferencial?
- ¿Cuáles son sus recomendaciones para cada una de las alternativas de diagnóstico diferencial?

Caso 2

- En su turno en urgencia consulta una madre con la historia que su hijo de 18 días tuvo un episodio en que ella observó coloración azul de la piel y una pausa respiratoria breve.
- El RN es el segundo hijo de madre de 38 años. Sin morbilidad durante el embarazo. Nacimiento por parto vaginal a las 39 +2/7 semanas. Apgar 9 – 9. PN 3450 g. Se fue de alta a las 48 h pesando 3.210 g.
- En su control en consultorio a los 15 días se encontraba en buenas condiciones, peso de 3620g. Sin otros antecedentes.
 - Describa: Los antecedentes de la historia clínica y los elementos del examen físico que usted va dirigidamente a buscar en este caso
 - ¿Cuál es su hipótesis diagnóstica?
 - ¿Después de evaluar al RN en el box de urgencia qué indicaciones le da al equipo de enfermería y a la madre del RN?

Caso 3

Dudas en puerperio

- Usted está de general de zona en el hospital de Victoria. Durante la visitas de puerperio en sus primeros tres meses ha recibido las siguientes consultas de las madres de Rn que ha atendido, para cada una de ellas explique a la madre a qué puede corresponder lo que ella consulta:
- A.- Al segundo día de vida la madre le muestra el pañal de la imagen:



INDISA - NEORED

Un Nuevo Concepto en Medicina Perinatal

- B.- Durante la semana le han consultado por distintos tipos de sarpullido que las madres han detectado antes del alta:
 - ¿cuáles son sus diagnósticos e indicaciones en cada caso de las fotografías y cuáles son sus diagnósticos diferenciales?



1: madre refiere que aparece al segundo día de vida



2a y 2b: Madre refiere que nació con esas lesiones.

4: Frente a cada una de las fotografías indique a qué corresponde y cuál serían su diagnóstico e indicaciones:





Caso 4

A los 7 días de vida, antes del control en consultorio se presenta madre en urgencia con un RN De sexo femenino que consulta por presencia de sangre en el pañal.

- ¿Indique qué elementos de la historia y examen físico considera usted relevante para el diagnóstico diferencial?
- ¿Cuáles son los posibles diagnósticos que explican la presencia de sangre en el pañal de un RN?



Caso 5

Al momento del alta la madre de un recién nacido sano de 35+3/7 semanas le pregunta su opinión sobre comprar un monitor de apneas porque se informó que su hijo al ser prematuro tiene un alto riesgo de muerte súbita.

- ¿Qué le informa a la madre sobre el riesgo de muerte súbita?
- ¿Servirá el monitor que le recomendaron? →
- ¿Qué le informa sobre el uso de monitores de apneas?
- ¿Cuáles son sus recomendaciones para la prevención de muerte súbita?



Caso 6

Usted se encuentra en un Cesfam y consulta una madre con un recién nacido de 15 días de vida porque lo ha notado muy decaído en el último día y hace 8 horas que no recibe nada de alimentación (ha intentado darle pecho y le ha ofrecido mamadera con agua). Al examen físico usted lo nota decaído, no recibe nada por boca, llanto débil, hipotónico, no se observan signos de dificultad respiratoria, sin otras alteraciones que le llamen la atención. El centro de derivación se encuentra a 40 km de distancia y le informan que tendrá ambulancia disponible para el traslado en 3 horas.

- ¿Cuáles son sus indicaciones mientras dispone de ambulancia para el traslado?

Caso 7: Fluidos

Se encuentra de turno en un hospital de mediana complejidad. La enfermera a cargo le pide que deje las indicaciones de fleboclisis preoperatorias para los siguientes pacientes que requieren cirugía de urgencia:

1. RN de 2 días de 3,2 kg de PN con diagnóstico de probable torsión testicular
2. RN de 26 días de vida con diagnóstico de hernia inguinal atascada

Caso 8

- Durante su visita en puerperio en un RN de 39 semanas, nacido por parto vaginal con PN 4250 g usted pesquisa el siguiente hallazgo al examen físico (fig 1):

1. ¿Cuál es su diagnóstico más probable?
2. ¿Cuáles son los diagnósticos diferenciales?
3. ¿Cuál es la diferencia en diagnóstico y riesgos entre la figura 1 y 2?
4. ¿Qué información e indicaciones le da a los padres?



Caso 9

Usted acude a un parto vaginal asistido por fórceps a las 39 semanas de una primigesta con antecedentes de diabetes gestacional no controlada, obesidad y macrosomía fetal. RN pesó 4.350 g.

- ¿Liste al menos 5 posibles complicaciones neonatales que podría presentar este RN?
- ¿Para cada complicación indique cómo haría el diagnóstico?